

○一般用漢方製剤承認基準の正誤表の送付について

(平成20年10月9日)

(事務連絡)

(各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課あて厚生労働省医薬食品局審査管理課通知)

平成20年9月30日付薬食審査発第0930001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「一般用漢方製剤承認基準の制定について」につき、今般、訂正すべき事項があることから、別添のとおり正誤表を送付いたします。

(別添)

正誤表

| 頁  | 番号  | 処方名                                   | 項目    | 誤                                                     | 正                                                       |
|----|-----|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10 | 39  | <a href="#">画像1 (1KB)</a><br>婦調血飲     | 効能・効果 | 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。                | 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。                  |
| 10 | 40  | <a href="#">画像2 (1KB)</a><br>婦調血飲第一加減 | 効能・効果 | 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。                | 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。                  |
| 19 | 75  | 呉茱萸湯                                  | 効能・効果 | 体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸                | 体力中等度以下で、手足が冷えて肩がこり、ときにみぞおちが膨満するものの次の諸症                 |
| 25 | 100 | 四物湯                                   | 効能・効果 | 体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の                 | 体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で胃腸障害のないものの次の諸症                 |
| 27 | 109 | 生姜瀉心湯                                 | 効能・効果 | 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うものの次の諸                | 体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、はきけやげっぷを伴うものの次の諸症                 |
| 28 | 114 | 小青竜湯                                  | 効能・効果 | 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の                 | 体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症                 |
| 40 | 171 | 二陳湯                                   | 成分・分量 | 半夏5—7、茯苓3.5—5、陳皮3.5—4、生姜1—1.5(ヒネショウガを使用する場合2—3)、甘草    | 半夏5—7、茯苓3.5—5、陳皮3.5—4、生姜1—1.5(ヒネショウガを使用する場合2—3)、甘草1—2   |
| 43 | 187 | 茯苓飲                                   | 効能・効果 | 体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の                 | 体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症                 |
| 46 | 202 | 麻子仁丸                                  | 成分・分量 | 麻子仁4—5、芍薬2、枳実2、厚朴2—2.5、大黃3.5—4、杏仁2—2.5(甘草1.5を加えても     | 麻子仁4—5、芍薬2、枳実2、厚朴2—2.5、大黃3.5—4、杏仁2—2.5(甘草1.5を加えても可)     |
| 47 | 205 | 抑肝散                                   | 効能・効果 | 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道               | 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症 <sup>注)</sup>  |
| 47 | 206 | 抑肝散加陳皮半夏                              | 効能・効果 | 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症 <sup>注)</sup> 、歯ぎ | 神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、更年期障害、血の道症 <sup>注)</sup> 、歯ぎしり |
| 48 | 212 | 苓桂朮甘湯                                 | 効能・効果 | 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の                | 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症                |